

Z E S D E B I J D R A G E
T O T D E K E N N I S D E R
I C H T H Y O L O G I S C H E F A U N A
V A N
C E L E B E S.
D O O R
D R . P. B L E E K E R.

Kort nadat mijne Vijfde Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Celebes was afgedrukt (Natuurk. Tijdschr. van Ned. Indië, 7^e deel, bladz. 225-260) ontving ik nog een zestal visehsoorten van Manado t. w. *Dactylopterus orientalis* CV., *Pterois volitans* CV., *Platycephalus celebicus* Blkr., *Platycephalus polyodon* Blkr., *Aploactis trachycephalus* Blkr en *Solenognathus Blochii* Blkr. Van die soorten waren *Platycephalus celebicus* en *Aploactis trachycephalus* nog niet van Celebes en ook nog niet in de wetenschap bekend. Ik laat hare beschrijvingen hieronder volgen. Ik heb er nog bijgevoegd de beschrijving van eene nieuwe soort van *Dactylopterus*, welke reeds lang in mijn bezit is, doch welke ik vroeger niet van *Dactylopterus orientalis* CV. had onderscheiden. Ik meen dat ik haar vroeger van Makassar heb ontvangen, doch daar ik beide voorwerpen er van gevoegd had bij mijne voorwerpen van *Dactylopterus orientalis* CV., ben ik omtrent de woonplaats derzer soort niet geheel zeker.

Het aantal mij thans bekende vischsoorten van Celebes bedraagt 354.

SCLEROPAREI.

Dactylopterus macracanthus Blkr.

Dactylopt. corpore elongato depresso, altitudine 7 circiter in ejus longitudine, latiore quam alto; capite quadranguli toto seabo obtuso abs-

que processibus osseis $4\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis, latiore quam alto; fronte inter oculos conava; rostro obtuso ante os prominentem; oculis diametro 3 circiter in longitudine capitis absque processuhus; osse suborbitali margine inferiore crenulato-dentielato postice spina brevi acuta; maxilla superiore maxilla inferiore longiore sub pupilla desinente; scuto capitis utroque latere in processum latum rugosum carinatum producto apice post spinam dorsalis spinosae verae 2_m desinente; incisura interparietali supra praoperulum desinente trigona lata latitudine postice $1\frac{1}{2}$ ad $1\frac{2}{3}$ in ejus longitudine; spina praoperculari basin ventralium multo superante incisura interparietali non vel vix breviore; squamis dorso lateribusque singulis medio carina elevata caninis posticis laminaeformibus denticulatis; squamis lateribus 45 p. m. in serie longitudinali; radio dorsali 1° antico libero filiformi capite cum processibus non multo breviore; pinna dorsali spinosa vera dorsali radiosa non humiliore; pectoralibus latissimis caudalis apicem attingentibus vel superanibus; ventralibus acutis curvatis capite absque processibus paulo brevioribus; anali convexa corpore humiliore; caudali emarginata angulis acuta superiore inferiore longiore $4\frac{1}{2}$ ad $4\frac{2}{3}$ in longitudine corporis; colore corpore superne viridescente vel coerulecente nebulis fuscescente-violaccis, inferne margaritaceo-roseo; membrana fili dorsalis antici nigricante; dorsali spinosa roseo-hyalina fuscescente-violaceo nebula; dorsali radiosa membrana roseo-hyalina radiis aurantiacis fusco annulatis; pectoralibus antice aurantiacis coeruleo rivulatis et maculatis, medio et postice fuscescente-violaccis maculis diffusis rotundis fuscis et ocellis numerosis flavis; media pinna pectorali macula oblonga rotundata violaceo-nigra triplo circiter ejus diametro a basi pinnae remota ocellis et vittulis curvatis flavis notata; ventralibus analique flavescente-aurantiacis; caudali membrana roseo-hyalina, radiis aurantiacis fuscescente annulatis.

B. 7. D. 1-1-6-8 (penult. interd. fiss.). P. 5/30 vel 5/31. V. 5. A. 6.

C. 3/7/3.

Habit. Macassar? in mari.

Longitudo 2 speciminum 140''' et 165'''.

Aann. Deze soort is voornamelijk herkenbaar aan haren langen preoperkeldoorn, betrekkelijk naauwe tusschenwandbeens-uitsneiding en de violetzwarte met geel geteekende vlek midden op de borstvin, welke vlek met ongeveer driemaal hare grootste lengte van de basis der vin verwijderd is.

Platycephalus celebicus Blkr.

Platyceph. corpore elongato depresso, latitudine 9 circiter, latitudine maxima $5\frac{1}{2}$ circiter in ejus longitudine; capite depresso $3\frac{1}{2}$ in longitudine corporis; latitudine capitis $1\frac{1}{2}$ circiter in ejus longitudine; oculis oblongis diametro $3\frac{1}{2}$ circiter in longitudine capitis, diametro $\frac{1}{3}$ circiter distantibus orbitis circis nullis; rostro absque maxilla superiore oculo breviore spinis

debilibus utroque latere vertice 9, orbita superne 17 p. m. antice 1 tantum, nasalibus 2, cristis suborbitalibus 11 p. m. posterioribus praecocularibus majoribus, praeperculo 4 2^a superiore et inferioribus multo longiore, operculo 2 cristis edentulis, suprascapulari 1, scapulari 1; interoperculo spina antrorum spectante nullo; naribus anterioribus cirro oculo multo breviore; maxilla superiore maxilla inferiore breviore sub oculi parte anteriore desinente; dentibus plurimi minimis, vomerini in thurmas 2 oblongo-rotundas distantes, palatini utroque latere in vittam gracilem dispositis; squamis etenoides, lateribus 53 p. m. in serie longitudinali; linea laterali squamis 3 vel 4 anticus tantum spinulis minimis armata; pinnis dorsalibus altitudine subaequalibus corpore vix humilioribus; pectoralibus latis oblique rotundatis 6 $\frac{2}{3}$, ventralibus analem attingentibus 5 circiter, caudali integra leviter convexa 6 et paulo in longitudine corporis; anali dorsali radiosa humiliore; colore corpore superne olivaceo dense fusco nebulato, lateribus aurantiaco maculis fuscis a fuso dorsi descendentibus, ventre margaritaceo-rosco; labiis aurantiacis fuso variegatis; genis aurantiacis vittis latis transversis fuscis; pinnis membrana hyalino-rosca, radiis aurantiacis maculis et punctis fuscis variegatis (radiis analibus inferne tantum); dorsali spinosa aurantiaco marginata superne fascia obliqua lata nigricante-violacea.

B. 7. D. 1-7-1/11 vel 1/12. P. 2 simpl. + 11 fiss. + 5 simpl. V. 1/5. A. 13 vel 14 (omni. fiss.). C. 11 vel 13 et lat. brev.

Hab.: Manado, in mari.

Longitudo speciminis unici 107'''.

Aanm. Deze Platyccephalus behoort tot de groep van het geslacht met talrijke bovenoogkuilsbeenstandjes. Zij laat zich gemakkelijk onderkennen aan het betrekkelijk geringe aantal der onderoogkuilsbeenstanden in verhouding tot dat bij de andere soorten der groep, aan den korten snuit, afwezigheid van tusschenoperkeldoornen, het aantal schubben op eene overlang-sche rei, kleurtekening, enz.

Aploactis trachycephalus Blkr.

Aploact. corpore oblongo compresso, altitudine 4 et paulo in ejus longitudine, latitudine (capite) 1 et paulo in ejus altitudine; capite acutiscaeno 3 et paulo in longitudine corporis; altitudine capitidis 1 $\frac{1}{3}$ ad 1 $\frac{2}{3}$ in ejus longitudine; linea rostro-frontali supra oculos convexa, ante oculos concava, rostro convexa; fronte inter orbitas concava; capite superne, rostro regionibusque postoculari et suboculari tuberculis numerosis osseis conicis ex parte spinaeformibus brevibus valde sebro; oculis diametro 3 circiter in longitudine capitidis, diametro $\frac{1}{2}$ circiter distantibus; iride superne cirris 2 ad 4 oculo brevioribus; rostro oculo vix vel non breviore

acuto; spina suborbitali unica acuta ante oculum desinente; rictu obliquo mediocri; maxilla superiore maxilla inferiore vix breviore sub oculi margine anteriore desinente; dentibus maxillis et vomerinis minimis, vomerinis in vittam ferri equini formam referentem dispositis; cirris maxilla inferiore utroque ramo pluribus, anterioribus posteriore multo brevioribus, posteriore oculo breviore; regione postmaxillari cirro unico oculo multo breviore; praeperculo margine postero-inferiore processibus granulatis 6, processu superiore spinaeformi obtuso, 2° spinaeformi acuto aperturam branchialem non attingente, ceteris obtusis 5° ceteris majore et crassiore; linea laterali autice cirris brevissimis conicis, leviter curvata, simplice, basin pinnae caudalis attingente; cute corpore alepidota regione suprascapulari cirris brevissimis conicis villosiuscula; pinna dorsali supra opercula incipiente diffuse bipartita, spinis 3 anterioribus incisura membranae dorsalis valde profunda a spinis sequentibus distinctis antrorum mobiliibus, spinis posterioribus spinis anterioribus longioribus corpore duplo circiter humilioribus; dorsali radiosa dorsali spinosa non altiore obtusa rotundata postice cum basi caudalis non unita; pinnis pectoralibus obtusis rotundatis $3\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis, radio libero pinna vix breviore; ventralibus rotundatis pectoralibus duplo fere brevioribus; anali dorsali humiliore obtusa convexa; caudali obtusa convexa $4\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis; colore corpore superne fuscescente-olivaceo fusco nebulato, inferne antice margaritacco postice margaritaceo-roseo; pinna dorsali aurantiaca parte spinosa fuscescente marmorata et fusco marginata, parte radiosa fasciis 2 obliquis diffusis fusco-violaceis; pectoralibus ventralibus analique fusco-violaceis transversim aurantiaco striatis vel punctatis, radiis insuper striis nigricantibus; radio pectorali libero aurantiaco fuscescente variegato; caudali aurantiaca radiis fusco annulata, membrana fusco plus minusve arenata.

B. 7. D. 11/9 (omn. simpl.). P. 1 liber. + 11 (omn. simpl.) V. 1/5
(omn. simpl.). A. 3/7 (omn. simpl.). C. 12 (omn. simpl.).

Habit. Manado, in mari.

Longitudo speciminis unici 75''.

Aanm. Deze soort is merkwaardig door haren door eene menigte beenachtige knobbeltjes ruwen kop, door haren vrijen borstvinstraal, weinig talrijke rugvindoornen, gladde ligchaams-huid, enz. Zij behoort tot het geslacht *Aploactis* T. Schleg., wanneer men de definitie van het geslacht terugbrengt tot onverdeelde stralen in alle vinnen en afwezigheid van gehemelte-tanden, bij overige karakteren van *Apistus*.